

Qui prélever ?

Tout enfant présentant des signes cliniques évocateurs d'un **syndrome pied-main-bouche** (caractéristique ou non) ainsi que ceux présentant une **herpangine**.

Rythmicité

Trois prélèvements maximum par semaine seront réalisés (pour trois patients différents). Idéalement, ces prélèvements devront être réalisés sur 3 jours maximum (dans une fourchette entre le lundi et le mercredi, par exemple).

Toutefois, compte-tenu de la recrudescence des cas en été et en automne, il sera possible de réaliser plus de 3 prélèvements par semaine (6 maximum) au cours des pics épidémiques. Deux envois par semaine pourront donc être réalisés.

Quel prélèvement ?

- Prélèvement de **bouche** si l'enfant présente des ulcérations buccales
- Sinon, prélèvement de **gorge** : ce prélèvement est valable pour toute recherche d'entérovirus, quelles que soient les manifestations cliniques.
-

Comment ?

Le kit de prélèvement comprend deux écouvillons sous blister ainsi qu'un tube contenant un milieu de transport adapté aux virus.



- N'utiliser qu'un seul écouvillon
- Appliquer l'écouvillon au niveau des lésions buccales ou au niveau de la gorge en appuyant légèrement.
- Oter le bouchon du tube et plonger l'écouvillon dans le milieu de transport. Couper la tige de l'écouvillon au niveau du trait pré-limé.
- Bien fermer le bouchon du tube afin d'éviter toute fuite lors de l'acheminement des prélèvements.
- Compléter l'étiquette avec initiales du nom (3 premières lettres) et prénom (première lettre) du patient et la coller sur le tube.
- Remplir la feuille de renseignements cliniques.
- Conserver l'ensemble à +4°C jusqu'à l'envoi.

Et après ?

- Une fois les prélèvements hebdomadaires réalisés, placer les 3 tubes de transport (vérifier auparavant la bonne fermeture des tubes et l'étiquetage) dans la petite boîte noire fournie. Cette boîte peut seulement contenir 3 tubes. Si plus de 3 prélèvements ont été réalisés, utiliser autant de boîtes noires qu'il est nécessaire. Ne mettre qu'une boîte noire par enveloppe.
- Fermer la boîte
- Placer la boîte dans un sachet plastique
- Insérer l'ensemble avec les feuilles de renseignements cliniques dans l'enveloppe T pré-imprimée.
- Envoyer les prélèvements par courrier postal.